


Patrons élytraux de la coccinelle asiatique
Elytral patterns of the Multicolored asian ladybeetle

Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera : Coccinellidae)



1. *conspicua*-1 (h^{C1}), 2. *conspicua*-2 (h^{C2}), 3. *gutta* (h^G), 4. *distincta* (h^D), 5. *transversifascia*-2 (h^{T2}), 6. *transversifascia*-3 (h^{T3}), 7. *transversifascia*-1 (h^{T1}), 8. *equicolor* (h^E), 9. *spectabilis*-1 (h^{S1} , τ = ridge), 10. *spectabilis*-2 (h^{S2}), 11. *tripunctata* (h^{T^*}), 12. *rostrata* (h^R), 13. *furficula* (h^F), 14. *intermedia* (h^I), 15. *aulica*-2 (h^{A2}), 16. *aulica*-1 (h^{A1}), 17. *uncinata* (h^U), 18. *axyridis*-1 (h^{X1} , heterozygous), 19. *axyridis*-2 (h^{X2}), 20. *axyridis*-3 (h^{X3} , heterozygous), 21, 22. *succinea*-1 (h^1), 23, 24. *succinea*-2 (h^2), 25, 26. *succinea*-3 (h^3 , τ = ridge), 27, 28. *succinea*-4 (h^4), 29, 30. *succinea*-5 (h^5), 31, 32. *succinea*-6 (h^6).

FIGURE 6—Types de coloration des élytres d'*Harmonia axyridis* selon KOMAI in IABLOKOFF-KHNZORIAN 1982.

Tiré de

Schanderl, H. (1987). Détermination des conditions optimales d'élevage de la coccinelle *Harmonia axyridis* Pallas (Col., Coccinellidae) et possibilité d'une production continue à l'aide d'une proie de substitution, les œufs d'*Ephestia kuehniella* Zeller (Lep., Pyralidae). Thèse de Doctorat, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille III (France)